Изабион

Культура	Доза применения	Время, особенности применения
Виноград	2,0–4,0 л/га Расход рабочей жидкости 800–1000 л/га	Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: перед цветением, в фазе окончания цветения — начала образования ягод, во время созревания при изменении цвета ягод.
Капуста	1,0–2,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–400 л/га	Некорневая подкормка 3 раза в течение сезона: после высадки рассады, далее — с интервалом 20 дней.
Картофель	1,0–2,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–400 л/га	Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: при высоте растений 15 см, в начале клубнеобразования, через 15 дней после последней подкормки.
Лук, чеснок	1,0–2,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–400 л/га	Некорневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: в период образования 4–5 листьев (в начале формирования луковицы), далее — с интервалом 20 дней.
Лук, чеснок	2,0–5,0 л/га В зависимости от системы полива	Корневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: в период образования 4–5 листьев (в начале формирования луковицы), далее — с интервалом 20 дней.
Плодовые культуры (яблоня, груша и т.д.)	2,0–4,0 л/га Расход рабочей жидкости 800–1000 л/га	Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: перед цветением, в период окончания цветения — начала образования плодов, в фазе плода размером с орех, в фазе плода размером 6–7 см.
Свекла сахарная, кормовая, столовая, турнепс, морковь	3,0–4,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–400 л/га	Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: в период образования 3–4 настоящих листьев, далее — с интервалом 20 дней.
Томат, баклажан, перец	1,0–2,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–400 л/га	Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов, при изменении цвета плодов во время созревания.
Томат, баклажан, перец	2,0–5,0 л/га В зависимости от системы полива	Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов, при изменении цвета плодов во время созревания.
Цветочно-декоративные культуры	1,0–2,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–1000 л/га	Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона весной в начале возобновления вегетации (для многолетних растений) или при высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних растений), далее — с интервалом 15 дней.
Цветочно-декоративные культуры	2,5 л/га В зависимости от системы полива	Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: весной в начале возобновления вегетации (для многолетних растений) или при высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних растений), далее — с интервалом 15 дней.