Зонатор

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
0,75-1,0	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса обычных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы и рапса - 16 мес.). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,75-1,0	Горох (при выращивании на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса обычных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы и рапса - 16 мес.). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	52(1)	-(3)
0,8-1,1	Рапс яровой (сорта и гибриды устойчивые к имидазолинам)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих растений в фазу 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса обычных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы и рапса - 16 мес.). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,8-1,1	Подсолнечник (сорта и гибриды устойчивые к имидазолинам) на семена и масло	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса обычных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы и рапса - 16 мес.). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	60(1)