

# Pseudobacterin-3®

## Рекомендуемый регламент применения\*

Культуры, Обрабатываемый объект	Норма расхода препарата, л/т; л/га	Расход рабочей жидкости л/т; л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, Особенности применения	Кратность обработок
Зерновые (пшеница чечевица, рожь, овес)	0,2 - 1 л/т	10 л/т	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян (при слабом развитии болезней)	Обработка семян за 1-2 суток до посева	1
	0,1- 0,5 л/га	200-300 л/га	Мучистая роса, сетчатая и тёмно-бу- рая пятнистость (при слабом развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец куще- ния – начало выхода в трубку	1
Зернобобовые (соя, нут, горох)	0,5 - 2,0 л/т	10 л/т	Плесневение семян, белая гниль, септориоз, церкоспороз, аскохитоз, мучистая роса, переноносороз, альтер- нариоз, бактериозы	Предпосевная обработка семян	1
	0,5 - 1,0 л/га	200-300 л/га		Опрыскивание растений в фазы 1-3 тройчатых листа, бутонизация – налив бобов.	2
Кукуруза	0,5-2,0 л/т	10 л/т	Бактериальное увядание, плесневение семян, фузариоз, гельминтоспориоз	Предпосевная обработка семян	1
	0,5-1,0 л/га	200-300 л/га		Опрыскивание растений в фазы 3-6 листьев, завязы- вание – налив початков.	2
Подсолнечник	0,5-2,0 л/т	20 л/т	Плесневение семян, белая гниль, серая гниль, септориоз, ложная мучистая роса, альтернариоз, бактериозы	Предпосевная обработка семян	1
	0,5-1,0 л/га	200-300 л/га		Опрыскивание растений в фазы 3-6 листьев, бутониза- ция – созревание.	2
Рапс	0,5-2,0 л/т	10-15 л/т	Плесневение семян, белая гниль, серая гниль, фомоз, ложная мучистая роса, мучистая роса, альтернариоз, бактериозы	Предпосевная обработка семян	1
	0,5-1,0 л/га	200-400 л/га		Опрыскивание в период вегетации в фазе розетки из 6-8 листьев и в фазе вытягивание стеблей – образова- ние стручков в нижнем ярусе.	2
Свекла сахарная	1-5 л/га	200-300 л/га	Бактериозы, мучистая роса, фузари- оз, угольная гниль, переноносороз	Опрыскивание первая обработка: в фазу «образования 2-х настоящих листьев» - «4-6 листьев», второе опры- скивание: в фазу – «8-10 листьев» - «50%омывание рядов» до начала уборки урожая.	2
Гречиха	0,5-2,0 л/т	10 л/т	Плесневение семян, серая гниль, ложная мучистая роса, фитофтороз, ascoхитоз, церкоспороз, бактериозы	Предпосевная обработка семян	1
	0,5-2,0 л/га	200-300 л/га		Опрыскивание растений в фазы всходы – начало вет- влении и бутонизацию.	2
Рис	0,5-1,0 л/т	10 л/т	Плесневение семян, альтернариоз, пирикуляриоз, бактериозы	Предпосевная обработка семян	1
	0,5-1,0 л/га	50-300 л/га		Опрыскивание растений в фазы трубкование, флаго- вый лист и выметывание метелки.	2
Лен	1-2 л/т	10 л/т	Фузариозная корневая гниль, плесне- вение семян, атракноз, фомоз, пасмо, мучистая роса, бактериоз	Предпосевная обработка семян	1
	1-2 л/га	200-300 л/га		Опрыскивание растений в фазы всходы – ёлочка и бутонизация.	2
Кормовые травы	0,5-1,0 л/га	300 л/га	Комплекс листостебельных болезней	Опрыскивание растений: 1-е – в период возобновле- ния роста (весной), 2-е – через 10 дней после первого куска.	2

Данный регламент носит рекомендательный характер и подтвержден полевыми испытаниями